

Førstehjælp til din hund



Har du tabt noget?

Kontakt eftersøgningstjenesten

På telefon: 71 10 40 69


Vagttelefonen har åbent fra 08.00-22.00 hver dag



Brug for vejledning til din hund?

Kontakt en
hundeadfærdskonsulent

Kreds 1 - Nordjylland	Brian Morgen	28 95 21 81
Kreds 2 - Midt- og Vestjylland	Helle B. Troelsen	30 27 74 00
Kreds 3 - Østjylland	Anette Barksman	20 22 40 16
Kreds 4 - Sønderjylland	Arne Andersen	75 25 88 40
Kreds 5 - Fyn	Tina Kristensen	23 66 43 84
Kreds 6 - Sjælland og Bornholm	Joan Andersen	26 14 13 63



Danmarks civile Hundeførerforening

Vi tilbyder spændende sociale udendørs aktiviteter for dig og din hund.

Frisk luft, hunde sjov, søge arbejde efter ting eller mennesker, lydighed som gå pænt, sætte sig, lægge sig og hente ting.

Agility, er en forhindrings bane, som løbes på tid med færrest fejl.

Rally er lydighed på en sjov måde. Hund og fører skal udfører øvelser, som står beskrevet på skilte opsat på en bane.

Nordisk foregår i skov og mark, hvor hunden skal finde ting eller mennesker ved hjælp af et spor eller fært (duft), som er lagt ud.

Nosework, som ordet siger, skal hunden udelukkende bruge sin næse. Hunden skal finde en bestemt duft, som er lagt ud i et rum eller naturen. Nogenlunde som man forestiller sig en narkohund arbejder.

IGP, er et internationalt program for brugshunde, hvor der arbejdes med de tre grupper; spor-, lydigheds- og forsvarsarbejde.

Vi har konkurrencer i alle discipliner.

Hundeførerkort er en prøve, hvor hund og fører skal udfører hverdags lydighed, almen vide om hund og hundeloven. Der gives ikke point, men du består eller ikke.

Vores sponsorer er:



Adfærdsproblemer/udfordringer:

Alt det som hunden gør, er **FOR HUNDEN** rigtigt. Vi mennesker skal lære hunden, hvordan den skal opføre sig/leve i vores verden, vores hjem. Derfor er der ikke noget uønsket adfærd, som DCH's hundeadfærds konsulenter ikke vil hjælpe med.

Almindelige dagligdags udfordringer **kan** være:

- * Hunden hopper op
- * Den gør
- * Den bider
- * Den kan ikke være alene hjemme
- * Den spiser/ødelægger hjemmet
- * Den kan ikke gå i snor
- * Den kan ikke lide andre (hunde / mennesker)
- * Osv.



Generel nedkøling

Den bedste måde at undgå nedkøling på, er ved at holde hunden varm, når den ikke er i bevægelse. Så snart I standser op, må du sørge for, at hunden komme i læ. Kuld-effekten vokser med vindstyrken. Det kan være godt at give et varmt dækken på, når I standser for at holde hvil.

Symptomer:

- * Skælven (forsvinder når hundens temperatur daler yderligere)
- * Stive muskler
- * Lav puls og langsom vejrtrækning
- * Huden føles kold ved berøring og under 35°
- * Apati efterfulgt af bevidstløshed

Hvad gør du:

- * Flyt hunden i læ eller endnu bedre ind i et hus og pak den ind i et tæppe. Sørg for at opvarmningen foregår langsomt
- * Giv hunden noget varmt at drikke eller om muligt en varm sukkeropløsning
- * Rådfør dig straks med dyrlæge

Lokale forfrysninger

De mest udsatte områder for lokale forfrysninger er pungen, ørerne, poterne og hale.

Symptomer:

- * Huden føles læderagtig og skaller af
- * Muskulævet er hvidt og føles voksagtigt

Hvad gør du:

- * Håndtér skaden forsigtig. Varm området op med en varm hånd, hvis skaden er begrænset.
- * Flyt hunden ind i et hus eller læ og pak den ind i et tæppe. Det er et godt tegn, hvis det forfrosne område får farve igen.
- * Hvis ikke lægger du den forfrosne kropsdel i lunkent vand—max. 40° — til det beskadigede område bliver rødt eller rødligt.
- * Optøningen er meget smertefuld for hunden. Rådfør dig med dyrlægen, hvis hudforandringerne ikke forsvinder helt.

Indholdsfortegnelse

Information.....	2
Førstehjælp ved ulykke.....	2
Sikring af hunden	2
Flytning af hunden	3
Puls.....	3
Vejrtrækning.....	3
Hjerte—lunge—redning	4
Mavedrejning.....	5
Blødninger	5
Kvælning	6
Heimlichmanøvren	6
Sår	6
Læg en potebandage	7
Flåter.....	7
Hvæpsestik.....	7
Forgiftning.....	8
Slangebide	8
Forbrændinger	9
Hedeslag	10
Dybtsiddende fremmelegemer	10
Nedkøling.....	12
Forfrysning.....	12
Almindelige adfærdsudfordringer	13



Information.

Førstehjælp til hunden adskiller sig ikke meget fra førstehjælp til mennesker. Sørg for at læse denne kvikguide, før du får brug for den.

Vigtig at lægge mærke til


- * Prøv altid at forebygge skader og sygdomme
- * Selv en bevidstløs hund kan, instinkt bide. Du bør derfor altid sikre hunden før du hjælper den. (Sørg for, den ikke kan bide dig).
- * Ved alvorlige ulykker bør du køre til dyrlægen, ring før du når frem, så dyrlægen kan forberede sig.
- * Forsøg at få andre til at lære førstehjælp

Førstehjælp ved ulykker

- * Sørg for at sikre ulykkesstedet. Du kan ikke hjælpe, hvis du selv kommer til skade. Gør stedet trygt at færdes i.
- * Bevar roen og hent/bed om hjælp. Det giver tryghed at have nogen til at hjælpe.
- * Få overblik over skaderne og prioriter, hvad der skal gøres først
- * Prøv at få kontakt med hunden. Reagerer den på tale og berøring? Hvis ikke tjekker du vejrtrækning og puls. Hvis den reagerer, undersøger du den for skader. Snak med hunden og giv den kropskontakt imens.
- * Når du har sikret stedet og dig selv, kan du køre hunden til dyrlæge hvis skaden kræver det.

Sikring af hunden

- * En syg/skadet hund kan finde på at bide!
- * Tag altid en line på hunden og læg en snudebandage, før du giver førstehjælp. Forbind aldrig snuden, hvis hunden kaster op eller har blødning i munden. Det er vigtigt, at hunden bliver beroliget, så den undgår at blive stresset.
- * Brug en mundkurv eller et stykke gazebind el.lign. til at sikre hundens snude.
- * Læg båndet rundt om snuden og bind enderne sammen bag nakken på hunden. Bandagen må ikke stramme men være fast.



OM Danmarks civile Hundeførerforening


DcH er Danmarks største forening for træning af hunde med 118 lokalforeninger og omkring 13000 medlemmer i hele landet. I DcH er alle hunde velkomne uanset race, blanding eller størrelse.

DcH tilbyder, mange forskellige aktiviteter for dig og din hund. Måske kender du allerede flere slags hundesport - spor, lydighed, familiehundetræning, agility, rally, nosework mm.

FRIVILLIGHED I HØJSÆDET

Alt arbejde i DcH udføres af frivillige, som brænder for netop hundearbejdet. Vi har en stor uddannelsesvirksomhed, hvor både instruktører, dommere m.fl. gennemgår kurser og længere uddannelser, så det er veluddannede instruktører, der tager imod dig.

Her kan du se at vi er i dit lokalområde fra Skagen til Åkirkeby



Læs mere om os på vores hjemmeside:

www.dch-danmark.dk

Eller ring til vores sekretariat på telefon: 21156610



Hedeslag

Den bedste måde at undgå hedeslag på, er ved at sørge for, at hunden altid har adgang til frisk luft, vand og skygge.

Lad aldrig hunden sidde i bilen. Hunden kan dø af hedeslag på 20 minutter.

Hvid du er nødt til at forlade hunden i bilen et kort øjeblik, skal du sørge for, at både bag-smækken og et vindue står åbent. Sørg også for at hunden har adgang til skygge og vand. Vær opmærksom på at solen flytter sig hurtig. Kig til hunden med jævne mellemrum for at se, om den har det godt.

Symptomer:

- * Øget puls og vejrtrækningsproblemer
- * Rødlige slimhinder
- * Opkastning, diaré
- * Uro, forvirring, krampe
- * Høj kropstemperatur
- * Bevidstløshed

Hvad gør du:

- * Flyt hunden til et køligt, skyggefuldt sted
- * Læg hunden i kølig/kuldslået vand eller overbrus den med vandslange
- * Stands nedkølingen og tør hunden, når kropstemperaturen når 40°
- * Få hunden til at drikke
- * Tag til dyrlæge

Dybt siddende fremmedlegemer

Hvad gør du:

- * Sørg for at sikre hunde (førstehjælp ved ulykker)
- * FJERN IKKE FREMMEDLEGEMET!
- * Læg kompres eller bandage rundt om skaden for at tætn området og sæt den fast med medicinsk tape, sådan at fremmedlegemet ikke kan bevæge sig under transport.
- * Tag straks til dyrlæge

Hvordan flytter man hunden

- * Sørg for at hundens ryg og nakke bliver støttet under flytning. Brug din jakke eller et tæppe som bære.
- * Ben med skader bør holdes højt.
- * Hvis hunden har svært ved at trække vejret, skal du lægge den i en stilling som letter vejrtrækningen. Hunden vælger ofte at sidde, alternativt kan du lægge den på brystet
- * Brug gerne et transportbur, når du flytter hunden

Det kan være svært og smertefuldt at flytte hunden, og selve flytningen kan give flere skader.

Puls.

Man kan ikke mærke hundens puls på halsen som på mennesker. Indersiden af hundens lår er bedst. Du bør øve dig hjemme før skaden er sket

- * Find pulsen på indersiden af låret ved at sætte to finger på, der hvor det bliver forbundet med kroppen. Flyt fingrene lidt rundt til du finder pulsen.
- * Hvis du ikke kan finde pulsen, kan du mærke hjertet ved at lægge din hånd på den nederste del af brystkassen

Normal puls:

Store racer: 80—110 slag/minut

Små racer: 100—130 slag/minut



Vejrtrækning

- * Du undersøger vejrtrækning ved at se, om brystkassen bevæger sig
- * Hvis du ikke kan se brystkassen bevæge sig, kan du sætte et spejl foran snuden.

Ingen vejrtrækning—mund—til—mund—metoden

Det første du skal gøre hvis hunden ikke trækker vejret, er at sikre dig at luftvejene er fri. Ingen fremmedlegemer i luftvejene.

- * Træk forsigtig hundens tunge ud af munden. Husk at hunden kan bide selv om den er bevidstløs.
- * Hvis der er synlige fremmedlegemer fjerner du dem. Hvis du ikke kan det, kan du bruge **Heimlichmanøveren**.
- * Luk hundens mund og ret forsigtig nakken ud. Pas på evt. nakkeskader
- * Sæt din mund over hundens snude
- * Pust, indtil du ser brystkassen hæve sig. Tilpas indblæsning hundens str.
- * Gentag 10 gange, pust 20 gange/minut
- * Undersøg om der er vejrtrækning. Hvis ikke fortsæt på vej til dyrlægen

Hjerte—lunge—redning (HLR)


HLR, anvendes når hunden ikke har vejtrækning, puls og du ikke kan få kontakt.

Genoplivning kan kun foretages hvis luftvejene er frie og der er mulighed for kunstigt åndedræt .

Ved hjertemassage på hunde sikres der ingen pumpeeffekt, men den mekaniske bevægelse kan stimulere hjertet til at slå igen.

- * Undersøg hunden for ydre blødninger. Du standser blødningen, ved at lægge et pres på såret.
- * Læg hunden på dens højre side, på et stabilt fladt underlag
- * Undersøg at luftvejene er frie og ret halsen ud. Hoved og hals skal helst danne en lige linie. Vær opmærksom på nakkeskader.
- * En person giver mund til mund, og en anden giver hjertemassage, ved at lægge hænderne på den nederste del af brystkassen, hvor venstrearmhule møder brystet. Pres kun så meget sammen at ribbenene bliver trykket 1/3 af brystkassens tykkelse.
- * **10—15 gange for små hunde**
- * **20—30 gange for mellemstore hund**
- * **35—40 gange for store hunde**
- * Hjertemassage 15 gange (1 pres pr. sek.)
- * 2 pust (Pust til maven hæver sig)
- * Gentag hjertemassagen og mund til mund, indtil hjerte og vejtrækning fungerer.
- * Kør til dyrlæge så snart hunden har puls og vejtrækning

Hjerte—lunge—redning skal helst udføres af 2 personer. Hvis du er alene, skal du huske at rette nakken ud og trække tungen ud før hver indblæsning.



Kilde: Agria.se

Forbrænding

Graden af forbrænding afhænger af, hvor dyb skaden er samt hvor stort området er.

Du kan undersøge, hvor alvorlig skaden er ved forsigtig at trække lidt i pelsen, hvis den løsner sig er forbrændingen dyb. Tag altid til dyrlæge.

Lette forbrændinger

Symptomer:

- * Afsveden pels, rød hud, smerter, vabler og hævelse

Hvad gør du:

- * Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker)
- * Skyl området med kuldslået vand (18⁰-20⁰) eller læg et koldt, vådt omslag. Stik ikke hul på evt. vabler
- * Læg et let, sterilbandage. Hunden må ikke slikke såret

Alvorlige forbrændinger

Symptomer:

- * Afsveden pels, rød og vabler
- * Pelsen løsner sig nemt på det beskadigede område
- * Smerter og hævelse
- * Hunden vil ikke rør sig

Hvad gør du:

- * Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker)
- * Undersøg vejtrækning, pels og sørg for frie luftveje
- * Dæk det beskadigede område med et koldt kompres opvredet i en saltvandsopløsning. Stik ikke hul på evt. vabler. Hunden må ikke slikke sig.
- * Kør straks til dyrlæge

Sørg for at sikre ulykkesstedet, før du hjælper hunden, især hvis det er en elektrisk fejl, der er årsag til forbrændingen. Giv ikke hunden noget at drikke, før du har talt med dyrlæge. Afbryd strømmen før du rører ved hunden, så får du ikke stød.

Forgiftning

Symptomer

- * Smerter, opkastning, svaghed, apati, sår omkring munden, øjenirritation, savlen, bevidstløshed og manglende vejrtrækning.

Hvad gør du :

- * Hvis giften indåndes, skal du tage hunden ud i frisk luft. Pas på, at du ikke selv indånder giften.
- * Prøv at identificere giften og kontakt dyrlægen hurtigst muligt.
- * Kontroller vejrtrækning og puls og sørg for frie luftveje.
- * Fremkald aldrig opkastning, hvis giften er en syre eller et petroleumsprodukt, benzin eller lignende.
- * Skyl hunden med masser af vand, hvis giften sidder i pelsen
- * Kontakt en dyrlæge før du behandler en hund, som er blevet forgiftet. Medbring evt. beholder/emballage som giften har været i

Slangebids

I Danmark er det kun hugormen, der er giftig.

Den forekommer hyppigt i visse områder, heder, plantager, klit- og strand områder, den er sjælden andre steder i landet. De fleste hunde bliver bidt i snuden, men de kan også blive bidt på kroppen især poter og ben. Hvis hunden er blevet bidt er det vigtigt at holde den i ro og straks køre til dyrlæge.

Symptomer:

- * Bidmærker, pels kan vanskelig gøre at se det
- * Voldsom hævelse (kan hæve yderligere i det første døgn)
- * Smerter, rødme og/eller blå mærker
- * Svaghed, skælven, savlen og manglende vejrtrækning

Hvad gør du:

- * Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker)
- * Hold hunden i ro, især hvis den er blevet bidt i pote eller benet
- * Bær hunden hen til bilen og kørs straks til dyrlægen

Mavedrejning/maveudspiling

Store hund kan rammes af mavedrejning/maveudspiling, som er en livstruende tilstand.

I nogle tilfælde kan mavesækken rotere om sin egen akse. Det stopper blodtilførslen til milt og mave og medfører en livstruende choktilstand. Man er ikke helt klar over årsagen til mavedrejning, men i de fleste tilfælde er det en sammenhæng med overspisning, foder, der gærer i maven, overdrevent væskeindtag eller kraftig motion før eller efter maden. Symptomerne udvikler sig hurtigt.

Symptomer:

- * Uro
- * Opkastningsforsøg
- * Hævelse af den forreste del af maven, den bagerste del af brystkassen, særlig højre side.
- * Svaghed, svag hurtig puls, chok, vejrtrækningsproblemer.

Hvad gør du:

- * Tag straks til dyrlæge! Hvert sekund tæller
- * Det er vigtigt, at have nærmest vagtdyrlæges telefon nr. ved hånden.

Blødning. Ydre blødninger.

Blødninger fra små sår standser normalt hurtigt. Ved alvorlige blødninger skal hunden have førstehjælp. Hvis blødningen ikke standses, kan det medføre cirkulationssvigt og hunden kan gå i chok. Det kan i værste fald være dødeligt. Hvis du mener, såret skal sys, kører du hurtigst muligt til dyrlæge.

Sprøjtende, pulserende blødning

- * Der er tale om blødning fra en arterie. Blodet har en klar rød farve.
- * Blødninger fra en arterie standses bedst ved at lægge pres på såret. Det gøres nemmest med 2 fingre.
- * For at holde trykket mod såret under transporten til dyrlægen, bør du lægge en bandage.
- * Om nødvendigt kan du lægge et gaze-kompres el.lign. lige under bandagen, den hjælper med at holde presset.

Kvælning

Symptomer:

- * Vejtrækningsbesvær eller kvælningsslyde, hoste
- * Gnider ansigtet mod jorden og gnider munden med poterne
- * Udstående øjne

Hvad gør du:

- * Åbn hundens mund. Træk tungen ud og kig hunden i halsen. Hvis du kan se et fremmedlegeme, kan du prøve at fjerne det med fingrene. Pas dog på ikke at trykke den længere ned.
- * Hvis det ikke lykkes, kan du bruge Heimlichmanøvren

Heimlichmanøvren

- * Hold hunden med hovedet nedad, om muligt med hundens ryg mod dit bryst.
- * Placer hundens hoved mellem dine ben
- * Tag fat rundt om hundens mave
- * Løft hunden op mod din brystkasse. Hvis du ikke kan løfte hunden, kan du lade den, stå på 2 ben og hold hænderne om hundens mave
- * Pres voldsomt 4 gange mod hundens mave med begge hænder. Vær ikke bange for at tage for hårdt fat. Du skal lægge så stor kraft i at det giver resultat. Tilpas kraften efter hundens størrelse.
- * Sørg for hundens luftveje er frie. Hvis de er det, puster du 3 gange ind i hundens mund. Hvis luften stadig ikke har fri passage fortsætter du med at trykke på maven.
- * Tag straks til dyrlæge.



Sår

Hunde kommer tit til at skære sig i poten. I mange tilfælde er hunden ikke særligt generet af et sår på poten. Den halter måske lidt og kan efterlade blodige potespor. Det er meget ualmindeligt at hunde forbløder pga. potesår. Hvis såret dybt eller sidder på bagsiden af poten, kan senerne blive beskadiget. I så fald bør du lægge et kompres.


Hvad gør du:

- * Sørg for at sikre hunden (førstehjælp ved ulykker)
- * Undersøg såret
- * Rens såret og fjern evt. grus og skidt.
- * Læg en bandage eller et kompres
- * Hold hunden i ro
- * Tag til dyrlægen og få såret undersøgt



Hvordan lægger man en potebandage?

Det er vigtig, at bandagen lægges rigtigt, så den sidder godt og ikke giver hudirritation.



- * Læg pladevat rundt om hele poten og et stykke op ad benet og små stykker mellem tæerne
- * Rul bandagen frem og tilbage på forsiden og undersiden af poten og opad benet
- * Mens du ruller bandagen på, kan du af og til sætte den fast med medicinsk tape
- * Slut af med selvhæftende bandage
- * Skift bandagen hver dag eller følg dyrlægens råd

Flåter

Når flåten har bidt sig fast i huden, begynder den at suge blod og sprøjte en væske ind som forhindre blodet i at koagulere. Samtidig kan den overføre andre sygdomme. Derfor skal den fjernes hurtigt.

Hvad gør du:

- * Du gennemgår hundens pels dagligt. Flåter sætter sig ofte bag ørerne, i ansigtet, omkring halsen, i armhulen og lysken.
- * Det er vigtig at få godt fat om flåten og forsigtig dreje den rundt indtil den slipper. Sørg for at få hele flåten med. Munddelene kan nemt blive siddende. Brug en flåttang
- * Kontakt dyrlægen, hvis hunden får feber, bliver træt eller evt. halter. Disse symptomer kan komme længe efter flåtbiddet.

Hvepsestik/insektstik

Et enkelt hvepse- eller bistik er som regel ikke farligt for hunden. Ved et større angreb er der risiko for, at hunden får hævelse og cirkulationssvigt.

Symptomer:

- * Smerter, hævelse, varme og rødme
- * Hunden slikker konstant et lille område på kroppen

Hvad gør du :

- * Fjern brodden hvis du kan
- * Rens med et antiseptisk middel, fx klorhexidin
- * Hold øje med hunden i den følgende tid
- * Kontakt dyrlægen, hvis hunden får det dårligt

